



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA,

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS,

*manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Martis decimâ-Octavâ  
mensis Aprilis, anno Domini M. DCC. LII.*

M. JOANNE-CLAUDIO-ADRIANO HELVETIUS,

Regi à Sanctioribus Consiliis, Regina Medico Primario & Re-  
giæ Scientiarum Academia Socio, Doctore Medico, Præside.

*An Ossa prope Articulum fracta, post Calli viveor, leni motu exercenda?*

I.



ATURA M omnibus providentem, medentemque primariè morbis; veteres agnoverunt Medici, confirmarunt recentiorum observationes. Hujus autem dogmatis nullum certius exhibetur specimen, quam in Chirurgicis, qui cum oculis subjiciantur fidelibus, facilem manibus permittunt accessum. In his etenim sive corporis cujusdam solidi vel fluidi præternaturalis noxas prævertere opus sit, illudque foras eliminare, sive partes discissas ac disruptas adunare, vel præter modum coalitas disjungere, aut extra morem auctas resecare, quis unquam his in artibus maximum & præcipuum naturæ locum denégaverit? Nec tamen idcirco quidquam Chirurgicam artem vellere videamur, quæ ab antiquis inventa Medicis & sagaciter exculta, ab horum vestigia prementibus neotericis utiliter elaborata est, & ulterius perficietur. Si enim sola naturæ miracula aliquando absque artis ope edere visa fuerit, scimus etiam solos illius nifus inutiles persæpe fuisse, & multis in casibus industriæ manûs auxilio destitutos salutarem non attigisse scopum. Quid igitur frugi præstare solet ars? Quinam suam confert symbolam? In eo totam esse rectè affirmaveris ut naturæ conatibus attentè & sagaciter consulens, iis semper & ubique faveat. Quantâ ergo solertiâ, quantâ sagacitate naturæ ordo sit investigandus, hinc vel maximè patet, ne scilicet inurili aut præposterâ medicationis arte, irrita imò noxia reddantur illius conamina. Hoc porro



locum obtinet in fracturis, quarum cura varias expostulat methodos, pro indolis ac symptomatum diversitate. Periculosam eam esse speciem quæ prope articulum contingit nemo sanè diffitebitur, qui ab eâ metuendum articuli rigorem & motûs amissionem agnoverit. Huic autem fracturæ speciei dicatam ἐν χειρὶ τοῦ quis adstruet, nisi prius ossium naturam, crescendi modum, & calli γένεσιν apprimè noverit.

## I I.

(a) Obs. de  
Oss. ferm. 1.  
cap. 4. §. 34.

**O**SSA, partes corporis durissimæ, solidissimæ, sensûs expertes, cæterarum basis ac fulcimentum, non minus peculiarem sibi vindicant fabricam, ac cætera corporis organa. Horum substantiam constituunt lamellæ numerosæ aliæ aliis superpositæ quas numero plurimas observare licet in ossibus diu ab aere exsiccatis. Hæ lamellæ texuntur fibris satis conspicuis quæ componuntur terreis partibus interposito glutine viscoso eoque indurato stricte adunatis. In ossibus verò longis, de quibus hic peculiariter sermo, quædam veniunt notanda. Pars media multò gracilior lamellis constat densissimis arctissime junctis, unde maximum illius robur. Intus canalis est fermè cylindraceus tenui obvestitus membranâ, medullam in vesiculis asservatam continens. In ossis autem substantiâ innumerosi adsunt pori, iique duplicis generis, quos primum descripsit *Clopton Havers* (a). Quidam enim secundum ossis longitudinem parallelo lamellis osseis ductu inter eas serpunt, dum alii his perpendiculares lamellas osseas directe perforant. Sic per huiusmodi tortuosos anfractus oleum medullare omnibus sensim distribuitur ossium partibus, horumque medendo ariditati fragilitatem avertit. Ubi verò à mediâ ossis parte recedunt lamellæ osseæ, tum laxius cohærent, nec jam se tangunt, versus latera expanduntur, fibras hinc & inde ad invicem mittunt, ex quibus nascuntur cellulæ plurimæ, subtili obductæ membranâ oleo medullari refertæ. In ossium capitibus textum illud spongiosum paulo densiori obducitur osseâ crustulâ, in cujus externâ superficie cavitates & eminentiæ quædam aspiciuntur ad articulationis usum efformatæ. In ipsomet autem articulo, præter capsulam articuli, cartilagineas intermedias, & ligamenta quædam quæ alicubi occurrunt, nonnullæ aspiciuntur glandulæ à *Cloptone Havers* (b) primum detectæ. Tenuem hæ glandulæ secernunt mucilaginem quæ cum oleo medullari poros osseos penetrante permixta ossium superficies lubricat & à fervore per attritum oriundo defendit. Est etiam peculiare ossibus involutum quod proprio nomine Periosteum vocant. Membrana est crassa valida, tendinæ indolis, exquisiti sensûs, in plures dividenda lamellas. Polita ipsi est exterior superficies: interior verò quæ externæ ossium superficiæ arctè hæret, sulcos habet à prominentibus ossium fibris excavatos. Fibrarum quibus componitur fasciculis non eadem est directio: sed aliæ longitudinem ossis servant, aliæ obliquis in omnem sensum ductibus mirè intertexuntur, quod fit maximè quâ parte tendines & ligamenta ossibus inferuntur. Nec solam mediam ossium partem involvit hæc membrana sed etiam ligamentorum capsulam investit, & ipsamet articuli cartilago quædam videtur esse periostei expansio. Sic in rachiticis quâ parte præter naturam sese tangunt ossa, ibi album, durum, densum, uno verbo verè cartilagineum efficitur periosteum (c).

(b) Ibid. ser.  
4. cap. 1.

(c) Vid. Duhamel  
loc. infrâ cit.

## I I I.

**O**SSIUM originem obscura premit caligo. Neque enim facilè explicandum qua ratione ex pulpâ molli & mucilaginosâ partes adeò densæ provenerint. Scimus duntaxat cartilagineas prius fuisse, nec nisi successivis indurationis gradibus tantam adeptas esse soliditatem. Sic nempe in tenerrimo embryone vix quidquam osseum deprehenditur; sed ubique molles & flexiles occurrunt cartilaginee. At verò certiora nobis prælucent circâ ossium accretionem. Eam à solo periosteio repetendam esse invenit D. Duhamel, & pulcherrimis comprobavit experimentis (a). Si enim animalium, gallorum v. g. gallinaceorum cibo permisceas *Rubia Tinctorum* radicem (cui singularis inest proprietas ossibus rubrum impertiri colorem) & dein iisdem per paucos dies absque rubiâ solitam concedas escam, sicque sæpius repetendo, in horum dissectis cadaveribus ossa plures ostendent lamellas rubro & albo colore alternatim distinctas. In junioribus etiam sæpiissime ob-

(a) Vid. Mor.  
Ac. Reg. Par.  
ann. 1741.  
1743.



servare licet in quibusdam partibus, ac præcipuè in costis lamellas periostei alterâ parte membraneas, alterâ osseas. Has si vi ab ossis corpore extrahere velis, avellentur simul osseæ fibræ plurimæ cum membranis omninò continuæ. Vêrum quidem est primis à natiuitate temporibus medullosum dilatari canalem (cujus expansionis & tempus & normam vid. apud laud. Auct.) quod fieri sanè nequit nisi ab admissio in ossearum fibrarum adhucdum mollium interstitiis succo nutritio; sed brevi debitam acquirit diametrum; certissimumque nihilominus est ossa præcipuam ab appositis successivè periostei laminis acquisivisse crassitiem.

Quâ verò mechanicâ ossea pars effingitur, eâdem læsa reparatur. Simul ac ruptum est os, statim inflammatur periosteum ut pote exquisitissimo donatum sensu; multum tumescunt & attolluntur ipsius laminulæ; indurantur, cartilagineam adipiscuntur indolem; tandemque osseæ penitus factæ ossium fractas partes firmant ac stringunt. Si namque fracta olim ossa per longitudinem ferrâ diviseris, in plurimis sæpius invenies hiantem adhuc in medio ossis rimam circulo osseo exteriori coopertam. Quòd si in quibusdam haud adeò certum remanet fracturæ vestigium, ne idcirco succi nutritii effusionem accuses. Tenues etenim fibræ ab externo periosteo propagatæ & cum similibus ab interno pariter ortis conjunctæ spatiolum exsiccatione suâ prorsus repleverunt. Hinc patet quàm verum sit Divi senis effatum, licet à plerisque recentioribus explosum fuerit, *ubi dissectum fuerit os . . . neque augetur neque coalescit* (b), quod apertius declarat Galenus \*.

(b) Aphorif.  
Sect. VI. 19.  
& Sect. VII. 28.

## I V.

**FRACTURAM** quæ propè articulum contingit, funestum sortiri exitum tristis loquitur experientia, docet ratiocinium. Licet enim callus hâc in parte non difficilius firmaretur ac in cæteris, licet omnibus prospexissent Medici sagacitas, Chirurgi industria, brevî tamen dum perfecta ossis consolidatio beare vota videbitur, pejor aderit morbus, nempe articuli rigor & immobilitas, seu *ankylosis*. Irritato enim periosteo in eo loco ubi fracturæ directè superjacet, debuit necessariò, non ibi tantum, sed & in vicinis inflammari partibus. Cum ergo osseus evaserit qui fracturam proximè ambit periostei circulus, jam adeò induratae erunt vicinæ partes, ut omnem articuli capsulam constringendo illius motum impendant. Extensionem etiam membri prohibebunt muscoli ab irritatione tendinum contracti \*\*. Aliunde verò viscosus ille liquor à glandulis mucilagineis secretus ex morâ nimiam adeptus spissitudinem lubricandis articuli superficiebus erit inhabilis. Quin & erit periculum ne exsiccatione suâ extrema ossium prorsus consolidet. Quisnam ergo expectari poterit motus ab aridis & proprio rore defraudatis articuli capsulâ & ligamentis, cum tot funesta obijciantur impedimenta? Hæc proinde remove morâ omni rejectâ sedulò curet Medicus. Statim igitur atque firmatus fuerit callus, huc respiciat omnis curatio, ut leniantur irritatae partes, exsiccatae & indurari inchoatae humectentur & emolliantur, resolvantur autem & discutiantur humorum stagnationes. Has indicationes explebunt fomenta cum aquâ tepidâ, oleis emollientibus & paululùm aromaticis. Utiliter etiam adhibebuntur adipēs & unguenta nervina. At verò ut efficacius hæc agant remedia, leni motu sollicitandum erit in articulo membrum. Quemadmodum enim longa quies quæ ad calli firmitatem requirebatur, rigorem in articulo ex parte procreavit, ita huic tollendo motu placido nil præstantius. Hujus ut & prædictorum emollientium protracto usu, indurata periostei membrana sensim relaxabitur, minúsque articulum

\* Videre autem licet in aliis animalibus comminuta ossa non omnino coalescere . . . si quando invenies, invenies autem sæpè, quemadmodum & nos, fracturæ oras callo inter se glutinatas, ubi hoc tibi curæ sit, callum deradens conspicias fracturæ oras se contingere, non tamen coaluisse solidatasque esse eo modo, quo in vulneribus glutinata caro coalescit. Gal. Comm. I. ad lib. Hipp. de Frac. Chart. Tom. XII. Text. 51.

\*\* A contractis musculis tibiæ post morbum acu-

rum, ankylosis spuria quamdam speciem observavit PATER meus optimus, in quâ flexæ tibiæ rigens articulus ægro, sive dum staret, sive dum ambularet fulcris innixus, multò magis cum extendi cogere-tur membrum, dolores procreabat adeò atroces, ut jam ad femoris resectionem, tamquam spem unicam, sese accingerent manu peritiores. Sanavit hominem balneo, emollientibus & aromaticis. Vid. Mon. Ac. Reg. Par. an. 1728.



à liberâ motione prohibebit. Leniti pariter & emollii tendines docilius extensionem admittent. Diluetur etiam & fluxilis reddetur quæ inspissari jam cœperat mucilago. Inungendis ossium superficiebus aptior evadet, aut si peccet copiâ ab hiantibus venarum osculis facilius excipietur. Tenuissimæ autem illæ mucilagineæ glandulæ à longiori membri quiete compressæ ferèque obstructæ sua liberius subibunt munia, sanguinem uberiùs appluentem combibent, mucosum liquorem majori secernent copiâ, unde major ad motum habilitas. Quod si his frustra tentatis, tamen ad vota non succederet curatio, confugiendum erit ad Aquas Thermâles, quales præ cæteris excellunt *Barregiana*. In his quotidie & diu detinenda erit affecta pars; in usum vocabuntur utilissimè harum *Ducia*, ut & lutorum applicatio. At simul leniter huc illuc flectendo rigida pars agitabitur; sic enim cætera remedia majori pollebunt virtute, sic meliùs ligamentorum relaxationem metiri & obtinere poteris.

## V

(a.) Hipp.  
Aphorif. Sect.  
II. 52.

**A**T, inquires, ab illo motu ingens imminet periculum, ne scilicet nocivus provocetur dolor, irritentur graviter coactâ extensione tendines, recens firmatus rumpatur callus. Sed quis hæc arcesset mala, nisi rudis & malè cautus? Non enim prescribimus ut durâ tractatione ac violento impetu flectatur aut extendatur subito membrum. Sensim assuefacienda est natura remedio, (a) quod, enim, paulatim fit, tutum est. Minimè proinde errabit qui membrum placidè & lento gradu circumrotabit. Parva primis diebus sufficiet extensio; sequentibus verò absque periculo augebitur. Ne quid præterea recens firmatum os rumpi periclitetur, vetant emollientia & nervina medicamina, quibus assiduè duratam partem ungi volumus; emollitæ enim & lubricatæ partes longè faciliùs obedient motui. Sic ab horum medicaminum utili consortio, longè major singulorum efficacia. Objici forsan poterit inopportuna esse morbi cum jam invaluerit curationem, eam præstare quæ principiis obstat medelam, neque ad præoccupandam ankylosen expectandum esse donec firmatus fuerit callus. Utinam sanè adeò efficax daretur Medicina! Fatemur quidem ab initio curationis utiliter adhiberi posse prædicta emollientia; sed hæc ad præveniendam ankylosen parum valere quotidiana docet experientia. Quid igitur? An membrum statim post fracturam movere non dubites? Sed brevè dissilient ossis fragmenta non sine magno dolore rursus componenda, præter modum inflammabitur périosteum jam à fracturâ irritatum, distrahentur cum acri molestiâ tendines, longa mora necetetur ossis consolidationi. Tutius itaque est in eodem situ fractum os servare, ut firmior habeatur callus; & si qua in articulo succedit nullâ arte vitanda ankylosis, postquam os omnino conferbuerit præscriptis remediis curare.

*Ergo Ossa prope Articulum fracta, post Calli révéoir, leni motu exercenda.*

## DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

*M. Anna-Carolus Lorry.*

*M. Dionysius Pantier de Labreuille.*

*M. Claudius - Carolus de Jean.*

*M. Bernardus-Nicolaus Bertrand, Scholarum Professor designatus.*

*M. Jacobus - Laurentius Mauroy.*

*M. Franciscus-Felicitas Colchu.*

*M. Stephanus - Ludovicus Geoffroy.*

*M. Natalis-Andreas-Joannes-Baptista Chesneau.*

*M. Joannes de Dieft.*

Proponebat Parisiis PETRUS-LUDOVICUS-MARIA MALOËT, Parisinus, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, Theseos Auctor,  
A. R. S. H. 1752, A SEXTA AD MERIDIEM.

Typis QUILLAU, Universitatis & Facultatis Medicinæ Typographi, 1752.